

REACCIONES ADVERSAS

Discrasia sanguínea e incluso aplásica con exitus letalis han sido, en raras ocasiones, asociadas a la administración de cloranfenicol. Sequedad de boca y con menos frecuencia náuseas, ocasionalmente también se presenta diarrea o vómitos pero estos síntomas son raras veces tan severos como para justificar la suspensión del antibiótico. A veces se encuentran casos de reacciones de sensibilidad.

Durante una administración oral prolongada se ha registrado neuritis óptica y periférica. Los niños prematuros y los recién nacidos, debido a su inmadurez fisiológica requieren una dosificación reducida. En este grupo de edad se han dado casos de reacciones tóxicas e incluso exitus letalis.

Las muestras y síntomas que deben servir de aviso son distensión abdominal, letargo, trastornos respiratorios que conducen a una cianosis gris. Designado el «síndrome gris» es sabido que está asociado a unos planes de dosificación excesiva, no apropiada para este grupo. Su progresión puede ser interrumpida y revertida la condición si se suspende la terapia rápidamente al conocer a tiempo la sintomatología asociada.

ENVASE

El Chloromycetin se suministra en cápsulas de 250 mg. N.º (379), frascos de 12 y 24.

PARA INSTRUCCIONES COMPLETAS SOBRE LA PRESCRIPCION, PUEDEN CONSULTAR LA MONOGRAFIA DEL PRODUCTO A LA DISPOSICION DE LOS MEDICOS QUE LA SOLICITEN.



Laboratorios Parke Davis, S. A. E.

Madrid