Spanish "PDR" November 1972 Vademecum Daimon

Parke Davis, S. A. E., Laboratorios

Emilio Vargas, 6. Madrid (17)

BENADRYL

COMPOSICION: Cloth. de difenhidramina.
ACCION: Antihistaminico, antiespasmodico y sedante.
ADMINISTRACION: Según cuadro clinico.
PRESENTACION: *Ampollas* de 1 cc (50 mg.), caja con 2. *Cápsulas* de 25 y 50 mg, frascos con 25. *Crema* al 2%, tubo con 30. *Liquido*, frasco con 120 cc.

BENADRYL EXPECTORANTE

COMPOSICION: Cada 100 cc: Benadryl, 280 mg; Cloruro aniónico, 2,70 g; Citrato sódico, 1,14 g; Cloroformo, 0,45 g; Mentol, 22 mg.
ACCION: Antitusivo y expectorante, con potente acción antihistaminica.
POSOLOGIA: Adultos, 1 a 2 cuchtas. varias veces al dia; *niños,* ½ a 1 cuchta. 2 veces al dia, según edad.
PRESENTACION: Frasco con 120 cc.

CALADRYL, crema y loción

COMPOSICION: Benadryl al 1 % con calamina, alcanfor y excipiente.
ACCION: Antihistaminico y antipruritico de aplicación local.
INDICACIONES: Contra el prurito producido por urticaria, herpes zoster, sarampión, etc. En reacciones alérgicas cutáneas, Picaduras de insectos, quemaduras e irritaciones solares. Dermatitis por dentición en niños, erupciones por pañales húmedos.
PRESENTACION: Crema, tubo con 42 g. *Loción,* frasco con 120 cc.

CLOROMICETIN

COMPOSICION: Cloranfenicol *Parke-Davis.*
ACCION: Antibiótico de amplio espectro, el cual comprende un gran número de bacterias gram-negativas y gram-positivas, todos los microorganismos del género rickettsia, linfogranuloma venéreo, del granuloma inguinal y de la psitacosis.
INDICACIONES: Fiebre tifoidea y otras salmonelosis, disenteria bacilar, rickettsiosis, infecciones de las vias urinarias causadas por una variedad de bacterias gram-negativas y gram-positivas, infecciones quirúrgicas graves, inclusive peritonitis, algunas infecciones respiratorias graves, meningitis, enfermedades venéreas, como blenorragia resistente a otros antibióticos, granuloma inguinal y linfogranuloma venéreo. Septicemias, brucelosis, psitacosis, etc.
POSOLOGIA: 50 mg/kg/dia, fraccionada en 4 dosis administradas a intervalos de 6 horas. En prematuros, recién nacidos a término y otros niños con inmadurez fisiológica, 25 mg/kg/dia.
ADVERTENCIAS: Siempre que sea posible, es conveniente efectuar hemogramas antes de instituir la terapéutica con el CLOROMICETIN y repetirlos durante la misma si es prolongada o intermitente o cuando la dosificación sea muy elevada, en previsión de una posible depresión reversible de la medula ósea. Se han observado, aunque raramente, discrasias sanguíneas irreversibles. El «síndrome gris» se ha descrito en prematuros y recien nacidos a término.
Por lo que se refiere a reacciones de hipersensibilidad, pueden presentarse reacciones febriles, erupciones cutáneas y reacciones alérgicas.
Para más información sobre reacciones adversas e interacciones, solicitar el Laboratorio monografía de CLOROMICETIN.
PRESENTACION Y P.V.P.: *Cápsulas* de 250 mg, frascos con 12, 122,60 pts.; con 24, 228,90 pts. *Crema* al 1 %, tubo 30 g, 79,20 pts. *Tópico* al 10 %, frasco 5 cc, 76,10 pts. *Intramuscular,* viales con 1 g, 96,40 pts.; con 2 g, 166 pts. *Succinato,* vial 1 g, 86,30 pts.

CLOROSTREP, cápsulas y liquido

COMPOSICION: Cada cáps. o *cuchta.* contiene: Cloromicetin, 125 mg; Dihidroestreptomicina, 125 mg.
INDICACIONES: Infecciones por salmonella y shigella, colitis ulcerosa, gastroenteritis, pre y postoperatorio intestinal, etc.
POSOLOGIA: Niños, 1 a 2 cuchtas. cada 6 horas; *adultos,* 2 a 4 cáps. cada 6 horas.
PRESENTACION: Cápsulas, frasco con 8. *Liquido,* frasco con 60 cc.

COMBEX

COMPOSICION: Cada cc: Vit. B_6, 10 mg; Vit. B_2, 0,33 mg; Nicotinamida, 10 mg; Acido pantoténico, 4 mg; Vitamina B_{12}, 10 mcg.
INDICACIONES: Anemias perniciosa, alimenticia y del esprue; astenia, neuritis, polineuritis, anorexia, debilidad, pelagra, hiponutrición, hepatitis y cirrosis hepática.
POSOLOGIA: Adultos, 2 cc al dia o alternos; *niños,* de 0,5 a 1 cc en dias alternos.
PRESENTACION: Vial de 10 cc.

COSLAN

COMPOSICION: Por cápsula: 250 mg de Acido mefenámico. *Supositorios* de 125, 250 y 500 mg de Acido mefenámico.
ACCION: Analgésico, antipirético y antiinflamatorio.
INDICACIONES: Cefaleas, dolores crónicos y del postoperatorio, dolor muscular, dolor traumático, odontalgias, gripe y estados afines.
POSOLOGIA: Adultos, 2 cáps. o 1 suposit. 500 mg 3 veces al dia; *niños* de 6 meses a 3 años, 1 suposit. 125 mg 3 veces al dia; de 4 a 8 años, 1 suposit. 250 mg 3 veces al dia; de menos de 10 kg de peso, 12 mg/kg, 3 veces al dia.
PRESENTACION Y P.V.P.: *Cápsulas,* frascos con 10, 40,70 pts.; con 25, 97,40 pts. *Supositorios,* cajas con 12, de 125 mg, 51,40 pts.; de 250 mg, 65,40 pts.; de 500 mg, 86,79 pts.

ELDEC, cápsulas

COMPOSICION: Asociación de vitaminas, minerales, hormonas, aminoácidos y fermentos digestivos.
ACCION: Suplemento fisiológico integral. Para contrarrestar precozmente los procesos seniles.
POSOLOGIA: 1 cáps. 3 veces al dia, con las comidas. En las mujeres, interrumpir el tratamiento durante los dias que dure la regla.

Parke Davis — Cont.

PRESENTACION: Cápsulas precintadas, frasco con 25.

EPANUTIN, cápsulas

COMPOSICION: Cada cápsula contiene: 0,10 g de Difenilhidantoinato sódico.
INDICACIONES: Epilepsia (gran mal y psicomotoral).
POSOLOGIA: Niños mayores de 6 años y *adultos,* 1 cáps. 2 a 4 veces al dia, hasta 6 cáps.
PRESENTACION: Cápsulas, frasco con 100.

EPANUTIN CON FENOBARBITONA, cápsulas

COMPOSICION: Cada cáps. contiene: Epanutin (difenilhidantoinato sódico), 0,10 g, y Fenobarbitona, 0,05 g.
INDICACIONES: Tratam. de la epilepsia cuando se desee un efecto sedante complementario.
POSOLOGIA: Hasta 3 cáps. diarias, a criterio médico.
PRESENTACION: Cápsulas, frasco con 50.

GAMMA GLOBULINA PARKE DAVIS

COMPOSICION: Gamma globulina humana en solución al 16 %.
INDICACIONES: Profilaxis y modificación del sarampión, hepatitis, rubéola y otras enfermedades víricas. Terapéutica de la agammaglobulinemia e hipogammaglobulinemia.
POSOLOGIA: Solamente por vía intram. La dosis profiláctica es 0,22 cc por kg de peso (2 cc por cada 10 kg de peso) y la dosis de modificación es 0,04 cc (0,5 cc por cada 10 kg de peso).
PRESENTACION Y P.V.P.: *Inyectable,* vial de 1 cc, 165 mg, 178,60 pts.; vial de 2 cc, 330 mg, 334,60 pts.

GERIPLEX, cápsulas

COMPOSICION: Asociación integral de vitaminas y minerales, reforzada con 25 fermentos digestivos (Taka-Diastasa).
INDICACIONES: Deficiencias vitamínicas y minerales. Anorexia, convalecencia, astenia, embarazo.
POSOLOGIA: 1 ó 2 cápsulas diarias.
PRESENTACION: Cápsulas, frascos con 25 y con 50.

HUMACORT, ungüento

COMPOSICION: 1 % de Cloranfenicol; 0,5 % de Paromomicina y 1 % de Acetato de hidrocortisona en una base especial de petrolato líquido y polietileno.
INDICACIONES: Dermatosis piógenas inflamatorias y pruriticas.
POSOLOGIA: De 2 a 4 aplicaciones al dia.
CONTRAINDICACIONES: Quemaduras extensas.
PRESENTACION: Ungüento, tubos con 30 g.

HUMATIN, cápsulas y liquido

COMPOSICION: Sulfato de paromomicina.
ACCION: Nuevo antibiótico de amplio espectro de acción antibacteriana y amebicida.
INDICACIONES: Infecciones entéricas por gérmenes gram-negativos y gram-positivos, trata-

Parke Davis — Cont.

miento del coma hepático, supresión o reducción preoperatoria de la flora intestinal y en la giardiasis, lambliasis, teniasis y otras parasitosis intestinales.
POSOLOGIA: Adultos, en el coma hepático 75 mg/kg/dia, o más, durante 4-6 dias, grado de insuficiencia hepática y respuesta del paciente; en el resto de las indicaciones, de 25 a 50 mg/kg/dia, en tratamientos 6-7 dias. *Niños,* dosis proporcional.
PRESENTACION: Cápsulas de 250 mg, caja con 8. *Liquido,* frasco con 60 cc, equiv. cuchta. a 125 mg de sulfato de paromomicina.

KETOLAR

COMPOSICION: Clorhidrato de ketamina *Parke Davis.*
INDICACIONES: Nuevo y diferente anestésico general disociativo, intravenoso o intramuscular, para inducción, como único anestésico para suplementar anestésicos de baja potencia.
POSOLOGIA: Dosis medias iniciales, vía intravenosa 2 mg/kg de peso; vía intram., 10 mg/kg de peso. Para mantenimiento de anestesia repetir dosis iguales o mitad de las antes señaladas.
PRESENTACION: Vial de 10 cc a concentración de 50 mg por cc; de 20 cc a concentración de 10 mg por cc. Envases clínicos de 25 ...

MATRABEC, cápsulas

COMPOSICION: Por cápsula: Carbonato de calcio, 600 mg; Sulfato ferroso, 150 mg; Vit. B_{12} cristalizada (Cianocobalamina), 5 mcg; Acido fólico, 0,25 mg. Vit. A (1,2 mg), 4000 UI (10 mcg), 400 UI; Mononitrato de tiamina, 3 mg; Vit. B_2 (Riboflavina), 2 mg; Niacina (Niacinamida), 10 mg; Vit. B_6 (Clorhidrato de piridoxina), 3 mg, Vit. C (Acido ascórbico), 50 miligramos.
INDICACIONES: Suplemento dietético que cubre las necesidades de minerales y vitaminas de la madre durante el embarazo y la lactancia como las del niño.
POSOLOGIA: Durante la gestación y lactancia, 1 cáps. al dia o más, a criterio médico.
PRESENTACION: Cápsulas, frascos con 50 y con 50.

MIDIKEL, tabletas y liquido

COMPOSICION: Por tableta: 0,50 g de metoxipiridazina. *Por cucharadita* (5 cc) equivalente a 0,250 g.
INDICACIONES: Infecciones urinarias, respiratorias, quirúrgicas y de tejidos blandos, enterias bacilares. Infecciones de la boca.
POSOLOGIA: Adultos, dosis inicial, 2 tabs. o cuchtas. (1 g); dias sucesivos, 1 tab. o 2 cc. (0,5); *niños,* dosis inicial, ½ tab. o una cc. (0,250 g) por cada 8 kg de peso el primer dia; sucesivos, mitad dosis anterior.
PRESENTACION: Tabletas, envases con 400. *Liquido,* frasco con 60 cc.

NEO-BENADRYL

COMPOSICION: Por cápsula: 25 mg de Clorhidrato de bromodifenhidramina.

Continúa en la ...

COMPETITIVE PROBLEMS IN THE DRUG INDUSTRY 15523