

472

DESCRIPCION DE ESPECIALIDADES

Parke Davis — Cont.

**ACCIÓN:** Antipruriginoso, potenciado con re-  
acción de efectos sedantes, especialmente en  
**INDICACIONES:** De manera especial, en pa-  
cientes en que se quiera evitar la acción sedante  
de los antipruriginosos.

**PRESENTACIÓN:** 4 caps. 3 veces al día.

**PRESENTACIÓN:** *Cápsulas*, frasco con 25.

**MORFININ**  
**COMPOSICIÓN:** Por tableta, 25 mg. de Aceti-  
lo de morfina, 0.05 mg. de Étilmorfina, 0.05  
**INDICACIONES:** Con indicaciones de analge-  
sias, disenterias, espasmos gastrointestinales,  
náuseas, vómitos, espasmos musculares, migra-  
nales, etc. Contraindicaciones: Enfermedades  
**POSOLÓGICA:** Consumar la terapéutica al 5.<sup>o</sup>  
de iniciado el ciclo menstrual, tanto si el  
paciente lo ha continuado o no. Interrumpir el tra-  
tamiento 7 días más tarde, aunque el período  
no se presente.

**PRESENTACIÓN:** *Tabletas*, envase con 21.

**PALMADAC, sales**  
**COMPOSICIÓN:** Por cc. Vitam. A, 6667 U.I.;  
Vit. B<sub>1</sub>, 100 U.I.; Vit. B<sub>2</sub>, 834 mg.; Vit. B<sub>6</sub>, 1.67  
mg.; Vit. C, 100 mg.; Vit. E, 1.67 mg.; Vit. H,  
3.33 mg.; Nicotinamida, 100 mg.; Ácido pan-  
tótico, 10 mg.; Vit. G, 8333 mg.; Vit. K, 100 mg.;  
Vit. M, 100 mg.

**INDICACIONES:** Suplemento polivitamínico-  
mineral para cualquier edad, pero de preferen-  
cia en niños débiles y niños prematuros.  
**POSOLÓGICA:** Para niños muchos días, 0.3 cc. para  
adultos hasta 1 año, 0.5 cc. para niños de 1 a  
5 años, 0.6 cc. para escolares y adolescentes, 0.6  
cc. para jóvenes y otros adultos.

**PRESENTACIÓN:** *Gotas*, frasco con 30 cc.,  
acompañado de un ep. graduado a 0.3 y 0.6 cc.

**PARKLASE, líquido**  
**COMPOSICIÓN:** Por 5 cc.: Vit. A, 5000 U.I.;  
Vit. B<sub>1</sub>, 100 U.I.; Vit. B<sub>2</sub>, 834 mg.; Vit. B<sub>6</sub>, 1.67  
mg.; Vit. C, 100 mg.; Vit. E, 1.67 mg.; Vit. H,  
3.33 mg.; Nicotinamida, 100 mg.; Ácido pan-  
tótico, 10 mg.; Vit. G, 8333 mg.; Vit. K, 100 mg.;  
Vit. M, 100 mg.

**INDICACIONES:** Deficiencias vitamínicas, ane-  
mia, asbestosis, convalecencia, desnutrición, eti-  
ología del crecimiento y trastorno normal en  
general.

**POSOLÓGICA:** De 1 a 3 aplicaciones diarias  
para niños, 0.3 cc. para adultos.

**PRESENTACIÓN:** *Líquido*, frasco con 60 cc.

**PALADAC CON MINERALES**  
**COMPOSICIÓN:** Por tableta: Vitamina A,  
6667 U.I.; Vit. B<sub>1</sub>, 100 U.I.; Vit. B<sub>2</sub>, 834 mg.;  
Vit. B<sub>6</sub>, 1.67 mg.; Vit. C, 100 mg.; Vit. E, 1.67  
mg.; Vit. H, 3.33 mg.; Nicotinamida, 100 mg.;  
Ácido pantótico, 10 mg.; Vit. G, 8333 mg.; Vit. K,  
100 mg.; Vit. M, 100 mg.; Ácido fólico, 0.05 mg.;  
Magnesio, 5 mg.; Zinc, 5 mg.; Yodo, 0.05 mg.;  
Cobalto, 0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.; Manganeso,  
0.05 mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio, 0.05 mg.;  
Boro, 0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.; Vanadio,  
0.05 mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05 mg.;  
Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio,  
0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.;  
Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05  
mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre,  
0.05 mg.; Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05  
mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibde-  
no, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05  
mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto,  
0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.; Manganeso, 0.05  
mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro,  
0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05  
mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo,  
0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.;  
Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio,  
0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.;  
Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05  
mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre,  
0.05 mg.; Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05  
mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibde-  
no, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05  
mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto,  
0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.; Manganeso, 0.05  
mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro,  
0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05  
mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo,  
0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.;  
Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio,  
0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.;  
Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05  
mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre,  
0.05 mg.; Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05  
mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibde-  
no, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05  
mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto,  
0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.; Manganeso, 0.05  
mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro,  
0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05  
mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo,  
0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.;  
Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio,  
0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.;  
Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05  
mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre,  
0.05 mg.; Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05  
mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibde-  
no, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05  
mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto,  
0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.; Manganeso, 0.05  
mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro,  
0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05  
mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo,  
0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.;  
Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio,  
0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.;  
Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05  
mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre,  
0.05 mg.; Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05  
mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibde-  
no, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05  
mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto,  
0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.; Manganeso, 0.05  
mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro,  
0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05  
mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo,  
0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.;  
Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio,  
0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.;  
Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05  
mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto, 0.05 mg.; Cobre,  
0.05 mg.; Manganeso, 0.05 mg.; Selenio, 0.05  
mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro, 0.05 mg.; Molibde-  
no, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05 mg.; Níquel, 0.05  
mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo, 0.05 mg.; Cobalto,  
0.05 mg.; Cobre, 0.05 mg.; Manganeso, 0.05  
mg.; Selenio, 0.05 mg.; Silicio, 0.05 mg.; Boro,  
0.05 mg.; Molibdeno, 0.05 mg.; Vanadio, 0.05  
mg.; Níquel, 0.05 mg.; Cromo, 0.05 mg.; Yodo,  
0.0