

15552 COMPETITIVE PROBLEMS IN THE DRUG INDUSTRY

13. Parke Davis Chlorostrep label, new one based on 1973 Chloromycetin Monograph.

"New Label based on 1973 new Parke Davis Chloromycetin Monograph"

Acquired: Madrid Spain
Izquierdo Pharmacy
Sep. 26, 1973

A la Profesión Médica:

CHLOROSTREP®

El uso clínico ha establecido el cloranfenicol (Chloromycetin® Parke-Davis) como un antibiótico efectivo de un amplio espectro bacteriano en el grupo de infecciones por rickettsias y en el linfogranuloma ptaicosis.

Posee una gran actividad antimicrobiana, atraviesa las barreras de los tejidos y se difunde ampliamente con rapidez por casi todos los tejidos y líquidos del cuerpo incluso por el líquido cerebrospinal.

La estreptomina es un antibiótico clínicamente indicado en infecciones causadas por organismos susceptibles. Administrada por vía oral su absorción es mínima aunque hayan pasado cantidades relativamente grandes a través del tramo intestinal en altas concentraciones.

Chlorostrep cápsulas es una combinación de cloranfenicol y estreptomina: cada cápsula contiene 125 mg. de Chloromycetin (cloranfenicol Parke-Davis) y 125 mg. de estreptomina como Sulfato.

INDICACIONES

El cloranfenicol es un potente agente terapéutico. Debe tomarse bajo la dirección de un médico y no debe ser utilizado en infecciones triviales. El cloranfenicol está específicamente indicado en la meningitis bacteriana, fiebre tifoidea, infecciones por rickettsias, infecciones bacteroides, infecciones intraoculares, septicemia debido a organismos gramnegativos y otras infecciones serias donde la evidencia bacteriológica o clínica dictaminan el cloranfenicol como el antibiótico apropiado.

La estreptomina por vía oral no es absorbida sistemáticamente y pasa a través del intestino en altas concentraciones, muchas bacterias patógenas intestinales, incluyendo shigelas y el grupo coli, son susceptibles a su acción bactericida.

El Chlorostrep se usa con éxito en el período pre-operatorio en operaciones de colon o recto, infecciones mixtas encontradas en la cirugía del intestino, tuberculosis ano-rectal, fistula anal, excisiones de quistes y senos pilonidales infectados y en infecciones entéricas o de tipo diarreico.

PRECAUCIONES

El Cloranfenicol debe tomarse bajo la dirección de un médico.

No debe usarse en infecciones triviales.

Discrasias sanguíneas e incluso anemia aplásica ha sido en raras ocasiones asociados a la administración de cloranfenicol. En los casos de administración prolongada o repetición de dosis deben hacerse análisis de sangre a intervalos regulares.

El cloranfenicol no está alineado en el fenómeno de interacción de droga y cuando los pacientes reciben concurrentemente anticoagulantes o anticonvulsivos, podría ser necesaria una adaptación de la dosificación de éstos.