

Adquirida from:
Centro Nacional De Farmacobiología
(Control of Medicines)
Madrid, Spain
Sep. 28, 1973

CLORANFENICOL

INDICACIONES ESPECIFICAS:

- 1º.- Infecciones agudas por Salmonella Typhi (no estando indicado para tratamiento de portadores).
- 2º.- Infecciones graves por diversas cepas de salmonellas, H. influenzae (específicamente en infecciones meníngeas), Rickettsias del grupo linfogranuloma-psittacosis, bacterias Gram - negativas causantes de meningitis o bacteriemia y, finalmente otros organismos sensibles que sean resistentes a todos los demás agentes antimicrobianos.

DOSIFICACION: Se añadirá a la propia de la especialidad el siguiente párrafo:

"La dosis diaria en adultos, no debe sobrepasar los dos gramos, ni prolongarse más de diez días."

EFFECTOS SECUNDARIOS:

A dosis elevadas y tratamientos prolongados, el cloranfenicol puede dar lugar a leucopenia, ~~o~~ granulocitosis y anemia por lo que es oportuno realizar controles hemáticos durante el tratamiento.

En algunos casos puede provocar reacciones neurológicas, de intolerancia o hiperérgicas.

CONTRAINDICACIONES:

Insuficiencia renal y mujeres gestantes durante el primer trimestre del embarazo.

En recién nacidos y prematuros están absolutamente contraindicadas dosis superiores a 25 mg.- 15 mg./Kg. día, respectivamente. La administración será por vía intramuscular y en una sola dosis.

ADVERTENCIA:

Debe reservarse su uso exclusivamente para las indicaciones específicas reseñadas.