

function del movimientos spinal. Le niveleo de hemoglobina esseva infra le norma in 55% del pacientes. Le numeration leucocytic esseva normal in 72,8%. Le sedimentation erythrocytic esseva anormalmente accelerate in 209 casos (i.e. 81,9%). Vistas oblique del articulationes sacro-iliac facilitava grandemente le recognition de precoce alterationes radiographic causate per le morbo. Le alterationes radiographic in le articulationes sacro-iliac e apophyseae consisteva de restriction o allargation del spatios articular, de irregular o paucio distincte margines articular, e de obliteration partial o complete del articulationes. Evidentia radiographic de affection sacro-iliac esseva trovate in omne le casos. Calcification de ligamentos vertebral esseva presente in 89 casos (i.e. 33,3%), osteoporosis in 64 (i.e. 23,9%).

Tres pacientes exhibiva le triade del syndrome de Reiter. Un paciente habeva ankylosis complete de ambe articulationes temporamandibular. Dece-tres (i.e. 4,5%) habeva iritis o iridocyclitis. Cinque habeva psoriasis. E. 36 (i.e. 13,5%) habeva anomalitates del columna vertebral.

Le tractamento utilisava varie mesuras therapeutic. Factores static esseva corrigite. Le pacientes esseva instruite in como respirar e como executar exercitios postular. Un appropriate regime dietetic esseva prescibite. Calor humide o siclesseva applicate al region dolorose del columna vertebral e del afficite articulationes peripheric. Fluido synovial esseva aspirate ab le articulationes peripheric. Hydrocortisona (25 a 50 mg) esseva injicite in le articulationes. Esseva utilisate therapia occupational e corrective. Aspirin (0,3 a 1 g) esseva administrate pro subjugar le dolores. Alicunes del pacientes recipeva diurnemente doses oral de hydrocortisona (50 a 100 mg) o de phenylbutazona (400 a 600 mg). Patientes con osteoporosis recipeva regimes osteoporotic. Sexanta-tres esseva equipate con apparatus orthopedic. Cento sexanta e cinque recipeva inter un e tres cursos de roentgenotherapy profunde per inter un e cinque portales dirige a areas dolorose del columna vertebral. Esseva administrate 600 a 750 r a omne portal in le prime curso, 450 a 600 in le secunde curso, e 300 a 450 r in le tertie curso. Cento vinti-cinque (i.e. 75,7%) obteneva bon o excellente responsas ab le irradiation. Le melior resultados esseva effectuate per le combination de physiotherapia, irradiation, exercitios postural emuscular, uso judicose de aspirina, e correction de factores static e de establete deformitates per mesuras orthopedic.

BIBLIOGRAPHY

1. Boland, E. W., and Present, A. J.: Rheumatoid spondylitis, J. A. M. A. 129: 843, 1945.
2. Hench, P. S., Slocumb, C. H., and Polley, H. F.: Rheumatoid spondylitis. Questions and answers, M. Clin. North America 31: 879, 1947.
3. Hart, D. F., Bagdanovitch, A., and Nichol, W. D.: The thorax in ankylosing spondylitis, Ann. Rheum. Dis. 9: 116, 1950.
4. Baker, L. D.: The diagnosis and care of Marie-Strümpell arthritis, Postgrad. Med. 15: 428, 1954.
5. Toone, E. S., Jr.: The treatment of rheumatoid spondylitis, Am. Pract. 2: 530, 1948.
6. Polley, H. F., and Slocumb, C. H.: Rheumatoid spondylitis: a study of 1,035 cases, Ann. Int. Med. 26: 240, 1947.
7. Mowbray, R., Latner, A. L., and Middlemiss, J. H.: Ankylosing spondylitis, Quart. J. Med. 18: 187, 1949.
8. Hart, F. D., Robinson, K. C., Allchin, F. M., and MacLagan, N. F.: Ankylosing spondylitis, Quart. J. Med. 18: 217, 1949.
9. Rolleston, G. L.: The early radiological diagnosis of ankylosing spondylitis, Brit. J. Radiol. 20: 288, 1947.
10. Oppenheimer, A.: The apophyseal intervertebral articulations roentgenologically considered, Radiology 30: 724, 1938.
11. Borak, J.: Significance of the sacroiliac findings in Marie-Strümpell spondylitis, Radiology 47: 128, 1946.
12. Golden, R.: Diagnostic roentgenology, 1956, The Williams and Wilkins Co., Baltimore, p. 543.
13. Boland, E. W., and Shebesta, E. M.: Rheumatoid spondylitis, correlation of clinical and roentgenological features, Radiology 47: 551, 1946.
14. Guest, C. M., and Jacobson, H. G.: Pelvic and extrapelvic osteopathy in rheumatoid spondylitis, Am. J. Roentgenol. 65: 760, 1951.